

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu – apel Wojewody do hodowców

22 kwiecień 2021 Godzina: 14:37

W związku z wystąpieniem 69 ogniska (stan na 22 kwietnia) wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zaapelował do hodowców o podjęcie działań mających na celu ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się grypy ptaków.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety bywa i tak, że do rozprzestrzeniania wirusa przyczynia się również człowiek i dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach postępowania.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) coraz bardziej rozprzestrzenia się na terenie województwa mazowieckiego (w tym momencie mamy potwierdzone 69 ognisk). Apeluje do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby.. To od Państwa zależy, czy zagrożenie zostanie ograniczone. Proszę pamiętać, że im szybciej uda się ograniczyć rozprzestrzenianie się grypy ptaków, tym mniejsze będą straty gospodarcze – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Wojewoda przypomniał także o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. Zgodnie z jego zapisami:

Hodowcy powinni:

- uniknąć miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
- myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,
- myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym, przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika,
- stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób;
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

Hodowcy nie powinni:

- dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych;
- karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

Zgodnie z obowiązującym prawem, każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,



wójt/burmistrz/prezydent miasta).



Wysoko zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu



Grypa ptaków jest chorobą wirusową występującą u drobiu i ptaków dzikich. Grypa ptaków może mieć różny przebieg u drobiu, od zachorowania z łagodnym obciążeniem ze strony układu oddechowego i spazmem niedrogi do ostrej postaci charakteryzującej się śmiertelnością sięgającą 100 proc.

Straty ekonomiczne powodowane przez grypę ptaków zależą od śmiertelności szczepu wirusa grypy, gatunku i liczby ptaków oraz liczby ferm dotkniętych chorobą. **Największe straty powodują epidemie HPAI u drobiu utrzymującego w fermach przemysłowych na obszarach intensywnej produkcji.** Są one wynikiem nie tylko wysokiej śmiertelności drobiu, ale w dużym stopniu również kosztów kwarantanny i odzyskiwania, a także wstrzymania przemieszczania i eksportu.



Wysoko zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu



Wojewoda Mazowiecki (Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny) przypomina o **bezwzględnie przestrzeganiu zasad biosekuracji, poprzez m.in.:**

- zabezpieczanie paszy i wody przed dostaniem owierzonego drobiu;
- stosowanie w gospodarstwach rolniczych i obiektach ochrony zdrowia zwierząt i ludzi środków ochrony przed chorobami zakaźnymi;
- unikanie kontaktu z drobiem w miejscach publicznych i w miejscach, w których utrzymywane jest drobiu;
- jeżeli utrzymywanie drobiu w gospodarstwie rolnym jest koniecznością, to należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby nie doprowadzić do rozprzestrzenienia choroby.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N1 są zarazone dzikie ptaki. Niestety bywa i tak, że do rozprzestrzeniania wirusa przyczynia się również człowiek.



Wysoko zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu



Aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, należy przestrzegać zaleceń skierowanych w szczególności do **osób posiadających drobiu oraz pracujących na fermach drobiu.**

Osoby takie:

powinny m.in.:	nie powinny m.in.:
• unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa; • stosować środki higieniczne przy wejściach do budynków, w których utrzymywane jest drobiu; • myć dokładnie z mydłem dłonie po możliwych kontaktach z tymi zwierzętami, które miały kontakt z tymi zwierzętami, które miały kontakt z tymi zwierzętami.	• dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub zakażonych zwierząt innych gatunków; • pościć drobiu woda ze zbiorników przeznaczonych dla ptactwa dzikiego; • karmić drobiu na zewnątrz, w miejscach, w których jest utrzymywane.



Ostrołęka